



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
DE METEOROLOGIE



ACTUALIZARE ESTIMĂRI METEOROLOGICE PENTRU INTERVALUL

22.09.2025 - 20.10.2025


Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Data actualizării : 22 Septembrie 2025

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025


TEMPERATURA AERULUI



Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.


Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025


TEMPERATURA AERULUI



Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025


CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025


TEMPERATURA AERULUI



Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025


CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025


TEMPERATURA AERULUI



Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII



Cantitățile de precipitații vor putea fi ușor deficitare în regiunile extracarpătice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.