





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.01.2026 ora 20 - 05.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ

RISC 4 - MARE



La peste 1800 m: În următoarele zile se vor semnala ninsori consistente, care vor creşte local stratul cu peste 20 cm şi izolat mai mult. Vântului puternic din ultimele zile a depus zăpada uşoară, de tip pulver, în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea creştelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafaţă. În profunzime se întâlneşte un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă recentă au aderenţă scăzută şi peste care pot aluneca cu uşurinţă. Deasupra solului regăsim un strat întărit. Astfel, în partea superioară a zăpezii vom întâlni un strat cu rezistenţă scăzută şi cu aderenţă slabă la stratul inferior, ce va depăşi pe alocuri 40-50 cm.



Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi chiar mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona creştelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt aşteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune local 10-20 cm de zăpadă. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni la altitudini de 1500-1800 m - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.01.2026 ora 20 - 05.01.2026 ora 20

MUNȚII BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAT







La peste 1800 m: Ninsorile din următorul interval vor mai depune local un strat de 10...20 cm de zăpadă proaspătă, crescând astfel grosimea stratului superior cu rezistență scăzută și aderență slabă la stratul inferior. Datorită vântului puternic din ultimele zile, zăpada proaspătă, ușoară, de tip pulver, s-a depus în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea creștelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafață. Sub acest strat se regăsește un strat de cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Deasupra solului este un strat întărit.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt așteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune local 10-15 cm de zăpadă. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1500-1800 m - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 2 - MODERAT






La peste 1800 m: Stratul de zăpadă, în prezent încă redus, va crește semnificativ în următorul interval, local cu 20...25 cm și izolat chiar mai mult. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde va forma noi plăci de vânt. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)** și poate crește în zilele următoare în funcție de acumulările de precipitații.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă va crește de la o zi la alta, local cu peste 10 cm. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau chiar avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **moderat(2)** în masivele nordice și **redus (1)** în rest.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.01.2026 ora 20 - 05.01.2026 ora 20

MUNȚII ȚARCU-GODEANU; PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - ÎNSEMENAT




La peste 1800 m: Se vor semnala ninsori însemnate cantitativ, care vor depune local 20-30 cm și izolat mai mult. Vântul puternic din ultimele zile a determinat în perioada precedentă apariția unor plăci de vânt mai ales în apropierea creștelor, depuse pe unii versanți nordici peste cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință, iar în zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. Deasupra solului se întâlnește un strat întărit. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze zăpada care se va depune sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni relativ reduse, dar va crește local cu 10-20 cm. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1500-1800 m - risc **moderat (2)**

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă va crește în continuare, local cu 25...30 cm, pe alocuri chiar mai mult. Cele mai importante cantități vor cădea în această noapte, ulterior ninsorile fiind moderate în fiecare zi. Zăpada va fi în cea mai mare parte tip pulver și se va depune peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde se vor forma noi plăci la suprafață. Odată cu creșterea stratului de zăpadă, pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat (2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.01.2026 ora 20 - 05.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE 48 de ORE

Vremea a fost geroasă în ultima noapte a anului trecut și în prima zi din noul an, ziua îndeosebi la altitudini mai mari de 1800m, iar noaptea în întreaga arie montană, cu temperaturi în creștere semnificativă în 02 ianuarie. Cerul a fost temporar noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat ninsori, în general slabe în primele 36 de ore din intervalul de diagnoză și moderate astăzi, când pe alocuri au depășit 10 l/mp în masivele vestice și sud-vestice. Vântul a avut viteze de 50-70 km/h în majoritatea masivelor, temporar la rafală cu 70...90 km/h la altitudini mari, viscolind ninsoarea și formând depozite însemnate pe anumite zone și izolat cu rafale ce au depășit 100...120 km/h pe crestele masivelor vestice. Temporar s-a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură. Stratul de zăpadă a avut creșteri de 5..10 cm în masivele vestice, creșteri de 1..2 cm în Carpații Orientali și ușoare scăderi la altitudini joase în cei Meridionali, prin tasare.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 02.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 124 cm la Vârful Omu, 85 cm la Bâlea-Lac, 14 cm la Țarcu, 15 cm la Sinaia, 8 cm la Păltiniș, 9 cm la Parâng, 6 cm la Predeal, 3 cm la Fundata, 12 cm la Cuntu și 2 cm la Voineasa

Carpații Orientali: 28 cm la Călimani, 25 cm la Lăcăuți, 21 cm la Bucin, 14 cm la Penteleu, 15 cm la Iezer-Rodnei, 8 cm la Ceahlău, 4 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 19 cm la Băișoara, 21 cm la Stâna de Vale, 11 cm la Semenice, 11 cm la Roșia Montană, 4 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 02.01.2026 ora 20 - 05.01.2026 ora 20

Vremea va fi în general închisă. Cerul va fi mai mult noros și va ninge consistent în întreaga arie montană. Cantitățile de precipitații vor depăși 10-15 l/mp în toate masivele, iar în primele 24 de ore local 20...25 l/mp în Carpații Occidentali, nordul celor Orientali și în vestul celor Meridionali și izolat 40-50 l/mp în zona Munților Apuseni. Cumulat se pot depăși 50-60 l/mp în masivele vestice și sud-vestice. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în toate masivele și temporar de 70-90 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea și menținând vizibilitatea scăzută, mai susținute în primele 24 de ore pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentali, unde rafalele vor atinge și depăși 100-120 km/h pe creste. Se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zonele înalte.

Temperaturi prognozate în intervalul 02.01.2026 ora 20 - 05.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -12...-7 grade

temperaturi maxime: în creștere de la -9...-5 grade în primele două zile spre -6...-2 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -10...-4 grade

temperaturi maxime: în creștere treptată de la -7...-2 grade spre -4...2 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc