





# Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.02.2026 ora 20 - 27.02.2026 ora 20



## MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

## RISC 4 - MARE






**La peste 1800 m:** În partea superioară a stratului întâlnim 15..20 cm de zăpadă proaspătă, căzută în ultimele două zile și depusă peste zăpada acumulată în ultima decadă, în straturi succesive. Astfel, în partea superioară a zăpezii vom întâlni un strat de zăpadă instabil în primii 40..70 cm, constituit din depunerile succesive de zăpadă din a doua parte a lunii, cu rezistență scăzută și coeziune slabă cu straturile mai vechi, subiacente. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, friabile și de grosimi importante, pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. În profunzime întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu de cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2-3 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă recent acumulată, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele straturi din profunzime - risc **mare(4)**.

**Sub 1800 m:** Stratul de zăpadă proaspătă e consistent și parțial umezit, depășind local 30..50 cm. Insolația și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea și tasarea stratului. Se pot declanșa curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat (3)**.

# Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.02.2026 ora 20 - 27.02.2026 ora 20

## CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

**RISC 4- MARE**






**La peste 1800 m:** În partea superioară a zăpezii s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește pe alocuri 25-30 cm, iar sub acesta regăsim un strat de 30..50 cm cu rezistență încă scăzută, constituit din depunerile succesive din a doua parte a lunii februarie. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt pe versanți cu orientări diferite, cei mai expuși fiind versanții nordici, estici și sudici. Stratul de zăpadă este astfel instabil în partea sa superioară, iar în profunzime întâlnim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. În zona creștelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2-3 metri. Pe pantele înclinate, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări, există riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul de zăpadă cu rezistență scăzută din partea superioară, plăcile de vânt formate în zonele înalte, precum și unele straturi din profunzime - risc **mare(4)**.

### Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este consistent până înspre altitudini joase, acumulările din ultima perioadă depășind local 40..60 cm și izolat mai mult pe unele văi. Insolarea și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea și tasarea stratului. Se vor semnala curgeri, avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari la altitudini de 1500-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi **însemnat(3)**.

## CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

**RISC 3- ÎNSEMNAT**



**La peste 1800 m:** În ultimele zile s-au depus local peste 10 cm de zăpadă proaspătă, iar în partea superioară a zăpezii întâlnim astfel straturi succesive de zăpadă depuse în a doua parte a lunii februarie, ce prezintă o rezistență scăzută în primii 30..40 cm. Dedesubt regăsim un strat mai vechi, incomplet stabilizat. În profunzime se întâlnesc cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt, de grosimi variabile, pe versanți cu orientări diferite (N, NE, E, SE, S). Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de peste 2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, inclusiv cel ce de pulver acumulat în ultimele zile, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini și **însemnat(3)**.


**Sub 1800 m:** răcirea vremii a adus ninsori înspre altitudini joase, dar stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu unele depozite mai însemnate pe anumite văi. Insolarea și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea și tasarea stratului. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici și medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

*Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.*

# Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.02.2026 ora 20 - 27.02.2026 ora 20

## CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



În partea superioară a stratului întâlnim zone cu 15..20 cm de zăpadă acumulată în ultima decadă, iar temporar va mai ninge viscolit. Stratul de zăpadă acumulat în a doua parte a lunii și care nu a avut timp de stabilizare este depus pe anumite pante peste vechea zăpadă, întărită, cu care are coeziune redusă. Izolat vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă și pe alocuri a celui subiacent, incomplet stabilizat, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

## CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă a avut creșteri locale de 15..20 cm în ultimele zile, având în medie grosimi de 30-40 cm și izolat mai mult pe anumiți versanți nordici, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Insolația și creșterea treptată a temperaturilor diurne vor duce la umezirea și tasarea stratului. Pe pantele înclinate va mai exista riscul declanșării unor curgeri, avalanșe de dimensiuni mici și medii pe văile și pantele cu acumulări mai importante, care să angreneze zăpada incomplet stabilizată din partea superioară, precum și unele plăci de vânt din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

*Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.*

# Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.02.2026 ora 20 - 27.02.2026 ora 20

## EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost vântoasă și s-a răcit, devenind geroasă în zonele înalte. Cerul a fost noros și pe arii extinse s-au semnalat ninsori viscolite, moderate cantitativ. *Cantitățile de precipitații au depășit 10-15 l/mp în toate grupele montane, local 15-20 l/mp în Carpații Meridionali și Occidentali și izolat 30 l/mp în masivele sud-vestice.* Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări temporare de 45-70 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, mai susținute în Carpații Meridionali, cu rafale ce au atins și depășit trecător 90-110 km/h pe creste. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. *Stratul de zăpadă a crescut semnificativ în toate masivele, în medie cu 5..10 cm în Carpații Orientali, local cu 10..20 cm în Carpații Meridionali și Occidentali și cu până la 30 cm în masivele sud-vestice.*

### Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 25.02.2026, ora 14:

**Carpații Meridionali:** 194 cm la Bălea-Lac, 189 cm la Vârful Omu, 165 cm la Țarcu, 75 cm la Sinaia, 70 cm la Cuntu, 61 cm la Parâng, 46 cm la Păltiniș, 33 cm la Predeal, 32 cm la Fundata.

**Carpații Orientali:** 127 cm la Călimani, 94 cm la Lăcăuți, 59 cm la Bucin, 51 cm la Ceahlău, 37 cm la Iezer-Rodnei, 36 cm la Penteleu, 11 cm la Poiana Stampei

**Carpații Occidentali:** 91 cm la Semenice, 57 cm la Băișoara, 42 cm la Vlădeasa 1800, 40 cm la Stâna de Vale, 9 cm la Roșia Montană

## PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 25.02.2026 ora 20 - 27.02.2026 ora 20

După o noapte geroasă în cea mai mare parte a zonei montane, vremea va intra într-un proces de încălzire, temperaturile diurne devenind pozitive vineri, 27 februarie, la altitudini de sub 2000 m. Cerul va fi temporar noros în noaptea de 25/26 februarie, când local se vor semnala ninsori slabe în Carpații Meridionali și Orientali, ce mai pot depune pe alocuri câțiva centimetri de zăpadă pe versanții nordici ai Carpaților Meridionali; apoi va deveni variabil, mai mult senin. Stratul de zăpadă va înregistra ulterior scăderi în întreaga arie montană. Vântul va mai avea intensificări temporare în noaptea de 25/26 februarie în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60-80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, mai susținute în zonele de creastă, cu rafale ce vor atinge și depăși trecător 80-110 km/h. Începând cu ziua de 26 februarie vântul va diminua semnificativ în intensitate, fiind în general slab și moderat, cu unele intensificări trecătoare pe creste. Pe alocuri se va mai semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură.

### Temperaturi prognozate în intervalul 25.02.2026 ora 20 - 27.02.2026 ora 20:

#### **Peste 1800 m:**

**temperaturi minime:** în creștere de la -16..-10 grade spre -12..-6 grade

**temperaturi maxime:** în creștere de la -8...-2 grade spre -3..3 grade

#### **Sub 1800 m:**

**temperaturi minime:** în creștere de la -12..-7 grade spre -10..-4 grade

**temperaturi maxime:** în creștere de la -4...2 grade spre 1..7 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

## Legendă

Scala riscului de avalanșă

| Gradul de risc  | Simbol                                                                             | Stabilitatea stratului de zăpadă                                                                        | Probabilitatea de declanșare a avalanșelor                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 – foarte mare |   | Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.                                                   | Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.                                                                                                                            |
| 4 – mare        |   | Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.                | Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari. |
| 3 – însemnat    |   | Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.          | Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.               |
| 2 – moderat     |   | Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. | Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.                                 |
| 1 – redus       |  | Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.                                   | Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.                                                           |

\* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


\*\* supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


## Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc