





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.03.2026 ora 20 - 27.03.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 2 - MODERAT






La peste 1800 m: Temperaturile vor crește ușor, dar se vor menține negative la peste 2000 m, cu valori diurne ușor pozitive sau apropiate de 0 grade la orele amiezilor la altitudini de sub 2000 m. Trecător va mai ninge slab, la intensitate mai mare începând din după-amiaza zilei de vineri, 27 martie. Stratul de zăpadă prezintă pe alocuri 5..10 cm de zăpadă recent acumulată și izolat mai mult pe anumite văi unde a fost transportată de vânt, iar în a doua parte a zilei de vineri se vor mai depune local peste 10 cm de zăpadă proaspătă. Pe majoritatea pantelor regăsim crustele portante de zăpadă înghețată de la suprafața zăpezii mai vechi, ce sunt mai consistente la peste 2000 m și pe versanții umbriți. Pe unele văi depozitele de zăpadă veche sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe. Va exista în continuare riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul incomplet stabilizat de la suprafață și pe alocuri unele plăci mai vechi de vânt din apropierea creștelor - risc **moderat(2)**. În cazuri extrem de izolate, la supraîncărcări mari ale stratului, pot fi dislocate unele straturi din profunzime.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e umezit și mai consistent la altitudini de peste 1600 m. Trecător se vor semnala precipitații mixte slabe. Temperaturile diurne vor fi pozitive la orele amiezilor, ceea ce va duce la umezirea suplimentară și diminuarea stratului de la altitudinile joase. Se mai pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantele cu zăpadă insuficient consolidată, riscul fiind prezent la supraîncărcări mari ale stratului - risc **redus(1)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.03.2026 ora 20 - 27.03.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2- MODERAT






La peste 1800 m: Temporar va ninge, mai consistent pe parcursul zilei de vineri, 27 martie, când se vor înregistra creșteri de strat local de peste 10..15 cm la peste 1800 m, cu precădere după orele amiezii, spre seară. Temperaturile diurne vor fi apropiate de 0 grade la altitudini de 2000 m la orele amiezilor și vor fi negative în rest. La suprafața stratului încă întâlnim vechile cruste portante de zăpadă înghețată pe majoritatea pantelor, mai consistente pe versanții nordici sau umbriți, iar în profunzime zăpada prezintă rezistență în creștere. În zona creștelor sunt formate cornișe. Pe văi depozitele vechi de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot semnala avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență moderată din partea superioară, cea care se va depune vineri, iar în cazuri extrem de izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, unele straturi din profunzime - risc **moderat(2)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă e consistent până înspre altitudini joase, depășind local 25..30 cm la altitudini de 1500 m. Temporar se vor semnala precipitații mixte. Temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară a stratului. Se pot semnala curgeri izolate pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație și avalanșe de dimensiuni mici, cu precădere la supraîncărcări mari ale stratului. Riscul va fi **redus(1)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: Temperaturile vor crește ușor, la valori pozitive sau apropiate de 0 grade ziua sub 2000 m, dar se mențin negative noaptea și dimineața, iar la orele amiezilor și în zona creștelor. La suprafața stratului întâlnim câțiva centimetri de zăpadă recentă și sub aceștia la suprafața stratului vom regăsi pe majoritatea pantelor crustele portante de zăpadă veche înghețată, mai consistente pe versanții nordici sau umbriți, iar în profunzime întâlnim zăpadă cu rezistență în creștere, exceptând unele areale restrânse în care aceasta poate ceda la supraîncărcări. Depozite mai consistente de zăpadă veche se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară, iar în cazuri extrem de izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, inclusiv unele straturi din profunzime, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc **moderat(2)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi umbrite. Temperaturile diurne pozitive și parțial insolația vor duce la umezirea suplimentară a stratului la altitudini joase. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici pe văile cu depozite mai consistente, mai ales la supraîncărcări - risc **redus(1)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.03.2026 ora 20 - 27.03.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



Stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi umbrite și prezintă multiple cruste și zăpadă în curs de stabilizare, ce este depusă pe anumite pante nordice peste o zăpadă veche și întărită spre bază. Ușoara creștere de temperatură și parțial insolația vor umezi ușor stratul. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici, mai ales pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc redus(1).

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 1 - REDUS



În apropierea creștelor întâlnim zone cu cruste portante de zăpadă înghețată, mai ales pe versanții nordici sau umbriți. Stratul de zăpadă e mai consistent la peste 1600 m, unde are în medie grosimi de 15-20 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Temperaturile diurne în creștere și pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Pe pantele mai înclinate și cu acumulări mai importante sunt condiții de avalanșe de dimensiuni mici, care să angreneze zăpada incomplet stabilizată, aflată în areale restrânse, mai ales la suprasarcini mari. Riscul de avalanșă va fi redus(1).

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 25.03.2026 ora 20 - 27.03.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost apropiată de cea obișnuită a perioadei, iar cerul variabil, temporar noros. Pe arii restrânse s-au semnalat precipitații mixte slabe, trecător ninsori în zonele înalte. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări trecătoare pe creste și în Carpații Orientali. Pe alocuri s-a semnalat ceață, asociată izolat și cu chiciură pe crestele cele mai înalte din Carpații Meridionali.

Stratul de zăpadă nu a suferit modificări importante în zonele înalte și a scăzut ușor la altitudini joase, în medie cu 2-3 cm, cu până la 7 cm la Păltiniș și 5 cm la Semenic.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 25.03.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 175 cm la Vârful Omu, 162 cm la Bâlea-Lac, 130 cm la Țarcu, 22 cm la Sinaia, 32 cm la Cuntu, 16 cm la Păltiniș, 15 cm la Parâng.

Carpații Orientali: 108 cm la Călimani, 71 cm la Lăcăuți, 22 cm la Bucin, 32 cm la Iezer-Rodnei, 35 cm la Ceahlău, 17 cm la Penteleu.

Carpații Occidentali: 47 cm la Semenic, 17 cm la Băișoara, 29 cm la Vlădeasa 1800, 1 cm la Stâna de Vale.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 25.03.2026 ora 20 - 27.03.2026 ora 20

Vremea va fi apropiată de cea obișnuită a perioadei, cu temperaturi în creștere ușoară. Cerul va fi temporar noros. Se vor semnală precipitații mixte în Carpații Meridionali și Occidentali, temporar ninsori în zonele înalte, pe arii mai restrânse și slabe în această noapte și mâine, iar vineri pe arii în extindere, începând din masivele sud-vestice, unde se vor acumula local 15..20 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare de 45-60 km/h și cu rafale ce vor atinge 70-80 km/h în zonele înalte, la noapte și mâine îndeosebi în Carpații Meridionali, iar ulterior și în restul masivelor. Stratul de zăpadă va înregistra la început scăderi ușoare, mai ales la altitudini joase, urmând să crească pe parcursul zilei de vineri, 27 martie, în zonele înalte ale Carpaților Meridionali, în special spre seară.

Temperaturi prognozate în intervalul 25.03.2026 ora 20 - 27.03.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -7 ... -2 grade

temperaturi maxime: în general între -4 ... 3 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -3 ... 3

temperaturi maxime: în general între 3 ... 10 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc